

GT療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	乳癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロンゼリー
特記事項 (パクリタキセル)	パクリタキセルアレルギー予防のデキサメタゾンは、症状がなければ半量ずつ減量が可能です。(最低量 1.65 mg 1A)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール		
			Day1	Day8	Day15
ゲムシタビン	mg (1000mg/m ²)	30分	●	●	×
パクリタキセル	mg (100mg/m ²)	1時間	●	●	×

【処方が必要な内服薬】

グラニセトロンゼリー2mg 1包 パクリタキセル 30分前
レスタミン錠 (10) 5錠 パクリタキセル 30分前

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
 HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
 HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)- → HBV-DNA 定量(+)- → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____