

### 乳癌術後補助 S-1(2投1休)療法

患者番号:                  氏名:                  性別:                  年齢:

がん種 (適応)	乳癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重                  kg                  体表面積                  m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項	ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌 投与期間は最長 1 年		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
エスワンタイホウ	mg / 回	2 週服用 1 週休薬
併用ホルモン剤 (                  )		

クレアチンクリアランス	80mL/min 以上	50mL/min 以上 80mL/min 未満
体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)	
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回	朝 20mg/回 夕 40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上~1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回	40mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60 mg/回	50mg/回

※クレアチンクリアランス 50mL/min 未満の患者における  
有効性・安全性は確立していない

#### 【処方が必要な内服薬】

エスワンタイホウ ( )   錠 2×朝夕食後

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**  
HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量  
HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン \_\_\_\_\_