

XC療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	乳癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	21 日間
体格	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	なし
カペシタビンの 投与量について	体表面積		初回投与量
	1.31 m ² 未満		900mg (3錠) / 回
	1.31 以上～1.64 m ² 未満		1200mg (4錠) / 回
	1.64 m ² 以上		1500mg (5錠) / 回

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
カペシタビン	mg / 回 ※投与量は上記参照	2週投与 1週休薬
エンドキサン	50mg / 回 (32.5mg/m ²) ※1錠 50mg を考慮する	2週投与 1週休薬

【処方が必要な内服薬】

カペシタビン (300) 錠 ×朝夕食後
 エンドキサン (50) 錠 ×朝夕食後
 ピドキサール (10) 6錠 3×毎食後
 尿素クリーム 10% 1日 5回以上塗布

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン _____