


アフィニトール療法

患者番号: _____ 氏名: _____ 性別: _____ 年齢: _____

がん種 (適応)	乳癌		
開始年月日	年	月	日
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項	<p>ER 陽性かつ HER2 陰性で非ステロイド性アロマターゼ阻害剤に抵抗性の局所進行性又は転移性の閉経後乳癌</p> <p>※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、投与開始前及び開始後は定期的に胸部CT検査を実施する</p> <p>※ 感染症が発現または悪化することがあるため、投与開始前に感染の有無を確認する</p> <p>※ 生ワクチンは併用禁忌</p>		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
アフィニトール	mg 1日1回 食後	連日服用

減量方法 ;



【処方が必要な内服薬】

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
 HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
 HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン _____