光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

イリノテカン(3 投 1 休)療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	乳癌		
開始年月日	年　月　日	1 コース期間	28　日間
体格	身長　cm　体重　kg　体表面積　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 （イリノテカン）	遺伝子多型（複合ヘテロ及びホモ）では減量を考慮 複合ヘテロ：(*6/*28)　ホモ：(*6/*6)(*28/*28)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
イリノテカン	mg（100mg/㎡）	90 分	●	●	●	×

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg　1 回 2 錠　1 日 3 回毎食後　/3 日間
ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠 100mg　1 回 1 錠　1 日 3 回毎食後　/3 日間
炭酸水素ナトリウム錠 500mg　1 回 1 錠　1 日 3 回毎食後 2 時間　/3 日間

☐HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
☐HBs 抗原(−) → ☐HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−)
☐HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → ☐HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
☐HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿