


カドサイラ療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	乳癌 (HER2 陽性手術不能又は再発乳癌)		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	21 日間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²		
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロン注
特記事項	※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、初期症状の確認及び胸部 X線検査の実施など観察を行う ※ 心機能のモニタリングは 12 週毎を目安に行う ※ 1 サイクル目は day8 に血小板数及び肝機能検査値を測定する ※ 【投与時間】 初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目 30 分への短縮可		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
カドサイラ	mg (3.6mg/kg)	※	Day1

減量方法 ;



【処方が必要な内服薬】

(初回のみ) ジクロフェナク坐薬 (25) カドサイラ 30 分前
(2 回目以降) カロナール (200) 2 錠 発熱時

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+)**and/or** HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン _____