

### カペシタビン療法

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

がん種 (適応)	乳癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	28 日間		
体格	身長	cm	体重                      kg                      体表面積                      m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
カペシタビン (A 法)	mg / 回	3 週投与 1 週休薬

体表面積	初回投与量
1.31 m <sup>2</sup> 未満	900mg(3 錠) / 回
1.31 m <sup>2</sup> 以上～1.64 m <sup>2</sup> 未満	1200mg(4 錠) / 回
1.64 m <sup>2</sup> 以上	1500mg(5 錠) / 回

#### 【処方が必要な内服薬】

カペシタビン (300) 錠 ×朝夕食後  
ピドキサール (10) 6 錠 3×毎食後  
尿素クリーム 10% 1 日 5 回以上塗布

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), or HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), and HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン \_\_\_\_\_