

タイケルブ+カペシタピン療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	乳癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	21 日間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²		
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
タイケルブ	1250mg 1日1回 ※食事の前後1時間以内を避ける	連日服用
カペシタピン (C法)	mg / 回	2週投与1週休薬

体表面積	初回投与量
1.36 m ² 未満	1200mg(4錠)/回
1.36 m ² 以上～1.66 m ² 未満	1500mg(5錠)/回
1.66 m ² 以上～1.96 m ² 未満	1800mg(6錠)/回
1.96 m ² 以上	2100mg(7錠)/回

【処方が必要な内服薬】

タイケルブ (250) 5錠 1×食事の前後1時間を避ける
カペシタピン (300) 錠 ×朝夕食後
ピドキサール (10) 6錠 3×毎食後
尿素クリーム 10% 1日5回以上塗布

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____