

### トラスツズマブ+ロゼウス(ナベルピン)療法

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	乳癌		
開始年月日	年    月    日	1 コース期間	21 日間
体格	身長                    cm    体重                    kg    体表面積                    m <sup>2</sup>		
嘔気・嘔吐リスク	最小度	制吐剤	なし
特記事項 (ロゼウス)	全開で投与し、10分以内に投与終了 末梢の場合は静脈炎予防のために投与後の生食を250mL (1時間)にしてください		
特記事項 (トラスツズマブ)	※【トラスツズマブ投与時間について】 初回90分、2回目60分、3回目以降は30分まで短縮可能 【トラスツズマブ投与量について】 投与予定日より1週間を超えた場合は初回量(8mg/kg)での投与を行う 【トラスツズマブ投与における心機能検査について】 心エコーを実施する(心疾患あり:6-8週毎、心疾患なし:12週毎)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール		
			Day1	Day8	Day15
ロゼウス	mg (25mg/m <sup>2</sup> )	10分以内	●	●	×
トラスツズマブ	初回 mg (8mg/kg)	※	●	×	×
	2回目以降 mg (6mg/kg)				

#### 【処方が必要な内服薬】

※初回のみ	ジクロフェナク坐薬 25 mg	トラスツズマブ開始 30 分前
※2回目以降必要時	カロナール (200) 2錠	発熱時

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_