

パクリタキセル療法(3投1休)

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種(適応)	乳癌		
開始年月日	年	月	日
1コース期間	28日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロンゼリー (+デキサート注 6.6mg)
特記事項	パクリタキセルアレルギー予防のデキサートは、症状がなければ半量ずつ減量が可能です。(最低用量: 1.65mg1A)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
パクリタキセル	mg (80mg/m ²)	1時間	●	●	●	×

【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠 (10) 5錠 パクリタキセルの30分前
 グラニセトロンゼリー2mg 1包 パクリタキセルの30分前

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン _____