

Bev+S-1 療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	42 日間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²		
嘔気・嘔吐リスク	注射: 最小度 経口: 軽度	制吐剤	なし
特記事項 (ベバシズマブ)	※【投与時間】 初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目 30 分への短縮可		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ベバシズマブ	mg (5mg/kg)	※	Day1、15、29
エスワンタイホウ	mg / 回	経口	4 週服用 2 週休薬

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m ² 未満	40mg/回
1.25 m ² 以上~1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

【処方が必要な内服薬】

エスワンタイホウ () 錠 ×朝夕食後

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____