

**Bev+mCAPIRI 療法**

患者番号:                  氏名:                  性別:                  年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年    月    日	1 コース期間	21 日間
体格	身長                  cm	体重                  kg	体表面積                  m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 0.75mg +デキサート注 6.6mg
特記事項 (ベバシズマブ)	※【投与時間】 初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目 30 分への短縮可		
特記事項 (イリノテカン)	遺伝子多型 (複合ヘテロ及びホモ) では減量を考慮 複合ヘテロ: (*6/*28)    ホモ: (*6/*6)(*28/*28) ※複合ヘテロ及びホモではイリノテカン 150 mg/m <sup>2</sup> へ減量		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ベバシズマブ	mg (7.5mg/kg)	※	Day1
イリノテカン	mg (200mg/m <sup>2</sup> )	90 分	Day1
カペシタビン (E 法)	mg / 回	経口	2 週服用 1 週休薬

体表面積	初回投与量
1.31 m <sup>2</sup> 未満	900mg(3 錠)/回
1.31 m <sup>2</sup> 以上~1.69 m <sup>2</sup> 未満	1200mg(4 錠)/回
1.69 m <sup>2</sup> 以上~2.07 m <sup>2</sup> 未満	1500mg(5 錠)/回
2.07 m <sup>2</sup> 以上	1800mg(6 錠)/回

**【処方が必要な内服薬】**

カペシタビン (300) 錠 ×朝夕食後	マグミット 330mg	6 錠 3×毎食後	/3 日間
ピドキサール (10) 6 錠 3×毎食後	ウルヂェ`オキソール酸錠 100mg	3 錠 3×毎食後	/3 日間
尿素クリーム 10% 1 日 5 回以上	炭酸水素 Na 錠 500mg	3 錠 3×毎食後 2 時間	/3 日間

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**  
 HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量  
 HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+) →  HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン \_\_\_\_\_