

**Bev+カペシタビン療法**

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年    月    日	1 コース期間	21 日間
体格	身長                    cm	体重                    kg	体表面積            m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	注射: 最小度 経口: 軽度	制吐剤	なし
特記事項 (ベバシズマブ)	※【投与時間】 初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目 30 分への短縮可		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ベバシズマブ	mg (7.5mg/kg)	※	Day1
カペシタビン (C 法)	mg / 回	経口	2 週服用 1 週休薬

体表面積	初回投与量
1.36 m <sup>2</sup> 未満	1200mg(4 錠)/回
1.36 m <sup>2</sup> 以上～1.66 m <sup>2</sup> 未満	1500mg(5 錠)/回
1.66 m <sup>2</sup> 以上～1.96 m <sup>2</sup> 未満	1800mg(6 錠)/回
1.96 m <sup>2</sup> 以上	2100mg(7 錠)/回

**【処方が必要な内服薬】**

ピドキサール 10mg 6 錠 3×毎食後  
尿素クリーム 1 日 5 回以上塗布  
カペシタビン

HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**  
HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量  
HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)- → HBV-DNA 定量(+)- → **消化器内科紹介**

**指示医師サイン** \_\_\_\_\_