

FOLFIRI 療法

患者番号:          氏名:          性別:          年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年   月   日	1 コース期間	14 日間
体格	身長                      cm	体重                      kg	体表面積              m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (イリノテカン)	遺伝子多型 (複合ヘテロ及びホモ) では減量を考慮 複合ヘテロ: (*6/*28)    ホモ: (*6/*6)(*28/*28)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
イリノテカン	mg (150mg/m <sup>2</sup> )	2 時間	Day1
レボホリナート	mg (200mg/m <sup>2</sup> )	2 時間	Day1
5-FU (急速静注)	mg (400mg/m <sup>2</sup> )	15 分	Day1
5-FU (持続静注)	mg (2400mg/m <sup>2</sup> )	46 時間	Day1

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg	1 回 2 錠	1 日 3 回毎食後	/3 日間
ウルテムオキシコール酸錠 100mg	1 回 1 錠	1 日 3 回毎食後	/3 日間
炭酸水素ナトリウム錠 500mg	1 回 1 錠	1 日 3 回毎食後 2 時間	/3 日間

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)
  - HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
  - HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) → HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_