

### UFT+ホリナート療法

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

がん種（適応）	大腸癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	35 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項	・8時間毎1日3回服用 ・食事の前後1時間を避けて投与 (薬剤血中濃度が食事の影響を受けるため)		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
UFT	mg / day (300mg/m <sup>2</sup> を目安)	4週投与1週休薬
ホリナート	75 mg / day	4週投与1週休薬

#### 【処方が必要な内服薬】

UFT                      3× 6時・14時・22時（食事の前後1時間を避ける）  
ユーズル（25）3錠 3× 6時・14時・22時（食事の前後1時間を避ける）

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**  
HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量  
HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)- → HBV-DNA 定量(+)- → **消化器内科紹介**

指示医師サイン \_\_\_\_\_