

mFOLFOX6 療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	14 日間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²		
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキササート注 6.6mg
特記事項 (オキサリプラチン)	オキサリプラチンは 6 コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキササート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mg で効果があったという報告があります		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
オキサリプラチン	mg (85mg/m ²)	2 時間	Day1
レボホリナート	mg (200mg/m ²)	2 時間	Day1
5-FU (急速静注)	mg (400mg/m ²)	15 分	Day1
5-FU (持続静注)	mg (2400mg/m ²)	46 時間	Day1

【処方が必要な内服薬】

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), or HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), and HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____