

### イリノテカン(3投1休)療法

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	28 日間		
体格	身長	cm	体重                      kg                      体表面積                      m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (イリノテカン)	遺伝子多型 (複合ヘテロ及びホモ) では減量を考慮 複合ヘテロ: (*6/*28)    ホモ: (*6/*6)(*28/*28)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
イリノテカン	mg (100mg/m <sup>2</sup> )	90 分	●	●	●	×

#### 【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg	1回2錠	1日3回毎食後	/3日間
ウルヂェキシコール酸錠 100mg	1回1錠	1日3回毎食後	/3日間
炭酸水素ナトリウム錠 500mg	1回1錠	1日3回毎食後2時間	/3日間

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) →  HBV-DNA 定量(+ ) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン \_\_\_\_\_