

カペシタビン療法(B法)

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
カペシタビン (B法)	mg / 回	2週投与 1週休薬

体表面積	初回投与量
1.33 m ² 未満	1500mg(5錠)/回
1.33 m ² 以上～1.57 m ² 未満	1800mg(6錠)/回
1.57 m ² 以上～1.81 m ² 未満	2100mg(7錠)/回
1.81 m ² 以上	2400mg(8錠)/回

【処方が必要な内服薬】

カペシタビン (300) 錠 2×朝夕食後
ピドキサール (10) 6錠 3×毎食後
尿素クリーム 10% 1日5回以上塗布

HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBs 抗体(+), and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____