光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

スチバーガ療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	大腸癌		
開始年月日	年　　月　　日		
1 コース期間	28　日間		
体格	身長　　cm　　体重　　kg　　体表面積　　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項	※　手術前 2 週間休薬 ※　肝機能検査を最初 2 サイクルは週 1 回、投与開始 6 ヶ月までは 2 週に 1 回行う 投与が決まったら角質除去、保湿対策などを開始する		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
スチバーガ	mg　1 日 1 回朝食後 （高脂肪食を避ける）	3 週投与 1 週休薬

【投与量について】
初回量：80mg あるいは 120mg から開始し、副作用が許容されれば増量していく

【処方が必要な内服薬】

ピドキサール（10）　6 錠　3×毎食後（1 週間前から使用）
尿素クリーム 10%　1 日 5 回以上塗布（1 週間前から使用）

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(−) → □HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−) → □HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿