

ベクティビックス+FOLFIRI 療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	大腸癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	14 日間
体格	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (イリノテカン)	遺伝子多型 (複合ヘテロ及びホモ) では減量を考慮 複合ヘテロ: (*6/*28) ホモ: (*6/*6)(*28/*28)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ベクティビックス	mg (6mg/kg)	1 時間	Day1
イリノテカン	mg (150mg/m ²)	2 時間	Day1
レボホリナート	mg (200mg/m ²)	2 時間	Day1
5-FU (急速静注)	mg (400mg/m ²)	15 分	Day1
5-FU (持続静注)	mg (2400mg/m ²)	46 時間	Day1

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg	1 回 2 錠	1 日 3 回毎食後	/3 日間
ウルヂェ 桉葉油酸錠 100mg	1 回 1 錠	1 日 3 回毎食後	/3 日間
炭酸水素ナトリウム錠 500mg	1 回 1 錠	1 日 3 回毎食後 2 時間	/3 日間
ミノサイクリン (100)	2C2×朝夕食後		
ヘパリン類似物質油性クリーム	全身		
ベタメタゾン酪酸エステル軟膏 (アンテベート GE)	体		
ロコイド軟膏	顔		

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
 HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
 HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)- → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____