光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

ベクティビックス+イリノテカン療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	大腸癌		
開始年月日	年　　月　　日		
1 コース期間	14　日間		
体格	身長　　cm　　体重　　kg　　体表面積　　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン 0.75mg +デキサート注 6.6mg
特記事項 （イリノテカン）	遺伝子多型（複合ヘテロ及びホモ）では減量を考慮 複合ヘテロ：(*6/*28)　ホモ：(*6/*6)(*28/*28)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ベクティビックス	mg（6mg/kg）	1 時間	Day1
イリノテカン	mg（150mg/㎡）	90 分	Day1

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg　　6 錠 3×毎食後　　/　3 日間
ｳﾙｿﾞﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠 100mg　3 錠 3×毎食後　　/　3 日間
炭酸水素ナトリウム錠 500mg　　3 錠 3×毎食後 2 時間　/　3 日間
ミノサイクリン（100）2C2×朝夕食後
ヘパリン類似物質油性クリーム　全身
ベタメタゾン酪酸エステル軟膏（アンテベート GE）　体
ロコイド軟膏　　顔

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(−) → □HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−)
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿