

### ベクティビックス+mFOLFOX6 療法

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

|                    |   |         |                           |
|--------------------|---|---------|---------------------------|
| がん種 (適応)           | 大腸癌   |         |                           |
| 開始年月日              | 年    月    日   | 1 コース期間 | 14 日間                     |
| 体格                 | 身長                      cm    体重                      kg    体表面積                      m <sup>2</sup>        |         |                           |
| 嘔気・嘔吐リスク           | 中等度   | 制吐剤     | パロノセトロン注<br>+デキサート注 6.6mg |
| 特記事項<br>(オキサリプラチン) | オキサリプラチンは 6 コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mg で効果があったという報告があります |         |                           |

| 投与薬剤        | 投与量                         | 投与時間  | 投与スケジュール |
|-------------|-----------------------------|-------|----------|
| ベクティビックス    | mg (6mg/kg)                 | 1 時間  | Day1     |
| オキサリプラチン    | mg (85mg/m <sup>2</sup> )   | 2 時間  | Day1     |
| レボホリナート     | mg (200mg/m <sup>2</sup> )  | 2 時間  | Day1     |
| 5-FU (急速静注) | mg (400mg/m <sup>2</sup> )  | 15 分  | Day1     |
| 5-FU (持続静注) | mg (2400mg/m <sup>2</sup> ) | 46 時間 | Day1     |

#### 【処方が必要な内服薬】

ミノサイクリン (100) 2C2×朝夕食後  
ヘパリン類似物質油性クリーム 全身  
ベタメタゾン酪酸エステル軟膏 (アンテベート GE) 体  
ロコイド軟膏 顔

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**  
 HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量  
 HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) →  HBV-DNA 定量(+ ) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン \_\_\_\_\_