

レンビマ療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	肝細胞癌		
開始年月日	年 月 日		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	なし
特記事項	※標準開始用量は 12mg ※体重 60kg 未満、または中等度(Child-Pugh7-8)肝機能障害患者の場合 8mg ※開始前に甲状腺機能チェック・心機能検査は必要 心電図・TSH は月 1 回程度で定期的実施 <注意が必要な副作用> 高血圧、出血、血栓塞栓症、肝障害、急性胆嚢炎、腎障害、消化管穿孔・ろう孔形成、気胸、可逆性後白質脳症、心障害、手足症候群、感染症、骨髄抑制、低カルシウム血症、創傷治癒遅延、間質性肺疾患、甲状腺機能低下		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
レンビマ	mg	連日服用

【処方が必要な内服薬】

レンビマカプセル (4) ●C1×朝食後
尿素クリーム 手足に

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), or HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), and HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____