

CAPOX 療法 (XELOX)

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	胃癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	21 日間
体格	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 0.75mg +デキサート注 6.6mg
特記事項 (オキサリプラチン)	オキサリプラチンは 6 コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mg で効果があったという報告があります		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
オキサリプラチン	mg (130mg/m ²)	2 時間	Day1
カペシタビン (C 法)	mg / 回	経口	2 週服用 1 週休薬

体表面積	初回投与量
1.36 m ² 未満	1200mg(4 錠)/回
1.36 m ² 以上～1.66 m ² 未満	1500mg(5 錠)/回
1.66 m ² 以上～1.96 m ² 未満	1800mg(6 錠)/回
1.96 m ² 以上	2100mg(7 錠)/回

【処方が必要な内服薬】

ピドキサール 10mg 6 錠 3×毎食後
尿素クリーム 1 日 5 回以上塗布
カペシタビン

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____