

S-1(2投2休)+パクリタキセル療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	胃癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	28 日間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²		
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロンゼリー (+デキサート注 6.6mg)
特記事項 (パクリタキセル)	パクリタキセルアレルギー予防のデキサメタゾンは、症状がなければ半量ずつ減量が可能です。(最低量 1.65 mg 1A)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
パクリタキセル	mg (60mg/m ²)	1 時間	●	●	●	×
エスワンタイホウ	mg / 回	経口	2 週投与 2 週休薬			

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m ² 未満	40mg/回
1.25 m ² 以上~1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

【処方が必要な内服薬】

グラニセトロンゼリー2 mg 1包 パクリタキセルの 30 分前
 レスタミン錠 (10) 5 錠 パクリタキセルの 30 分前
 エスワンタイホウ () 錠 ×朝夕食後

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+)
- **消化器内科紹介**

指示医師サイン _____