

### S-1(2投1休)+ドセタキセル術後補助療法

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	胃癌		
開始年月日	年    月    日	1 コース期間	21 日間
体格	身長                    cm	体重                    kg	体表面積                    m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロン注
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ドセタキセル (2~7クール目)	mg (40mg/m <sup>2</sup> )	1 時間	Day1
エスワнтаイホウ (1~7クール目)	mg / 回	経口	2 週服用 1 週休薬

<8クール目以降>

エスワнтаイホウ (術後1年まで)	mg / 回	経口	4 週服用 2 週休薬
-----------------------	--------	----	-------------

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上~1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

#### 【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ ( ) 錠 ×朝夕食後

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_