

mFOLFOX6 療法

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	胃癌		
開始年月日	年    月    日	1 コース期間	14 日間
体格	身長                    cm    体重                    kg    体表面積                    m <sup>2</sup>		
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (オキサリプラチン)	オキサリプラチンは 6 コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mg で効果があったという報告があります		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
オキサリプラチン	mg (85mg/m <sup>2</sup> )	2 時間	Day1
レボホリナート	mg (200mg/m <sup>2</sup> )	2 時間	Day1
5-FU (急速静注)	mg (400mg/m <sup>2</sup> )	15 分	Day1
5-FU (持続静注)	mg (2400mg/m <sup>2</sup> )	46 時間	Day1

【処方が必要な内服薬】

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) →  HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_