

イリノテカン(3投1休)療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	胃癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	28 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (イリノテカン)	遺伝子多型 (複合ヘテロ及びホモ) では減量を考慮 複合ヘテロ: (*6/*28) ホモ: (*6/*6)(*28/*28)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day1	Day8	Day15	Day22
イリノテカン	mg (100mg/m ²)	90 分	●	●	●	×

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg	1回2錠	1日3回毎食後	/3日間
ウルヂェ キシコール酸錠 100mg	1回1錠	1日3回毎食後	/3日間
炭酸水素ナトリウム錠 500mg	1回1錠	1日3回毎食後2時間	/3日間

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
 HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
 HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____