光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

サイラムザ+パクリタキセル療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	胃癌			
開始年月日	年　月　日		1 コース期間	28　日間
体格	身長　cm　体重　kg　体表面積　㎡			
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロンゼリー（+デキサート注 6.6mg）	
特記事項（サイラムザ）	【投与時間】 初回は 60 分、忍容性が良好であれば 2 回目以降は 30 分まで短縮可			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
パクリタキセル	mg（80mg/㎡）	1 時間	●	●	●	×
サイラムザ	mg（8mg/kg）	※	●	×	●	×

【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠（10）5 錠　サイラムザ or パクリタキセルの早い方の 30 分前
グラニセトロンゼリー2 ㎎　1 包　レスタミンと同時に内服

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(−) → □HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−)
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿