

トラスツズマブ+SOX100療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	胃癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	21 日間
体格	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 0.75mg +デキサート注 6.6mg
特記事項 (オキサリプラチン)	6 コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mgで効果があったという報告があります		
特記事項 (トラスツズマブ)	※【投与時間について】 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降は 30 分まで短縮可能 【投与量について】 投与予定日より 1 週間を超えた場合は初回量 (8mg/kg) での投与を行う 【心機能検査について】 心エコーを実施する (心疾患あり: 6-8 週毎、心疾患なし: 12 週毎)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
オキサリプラチン	mg (100mg/m ²)	2 時間	Day1
トラスツズマブ	初回 mg (8mg/kg) 2 回目以降 mg (6mg/kg)	※	Day1
エスワンタイホウ	mg / 回	経口	2 週服用 1 週休薬

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m ² 未満	40mg/回
1.25 m ² 以上~1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

【処方が必要な
内服薬】

ジクロフェナク坐薬 25mg (初回のみ) トラスツズマブ 30 分前
(発熱時) カロナール錠 (200) 2 錠
エスワンタイホウ () 錠 ×朝夕食後 夕食後から服用開始

HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____