

パクリタキセル療法(3投1休)

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	胃癌					
開始年月日	年	月	日			
1 コース期間	28 日間					
体格	身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロンゼリー (+デキサート注 6.6mg)			
特記事項	パクリタキセルアレルギー予防のデキサートは、症状がなければ半量ずつ減量が可能です。(最低用量: 1.65mg1A)					

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
パクリタキセル	mg (80mg/m ²)	1 時間	●	●	●	×

【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠 (10) 5 錠 パクリタキセルの 30 分前
グラニセトロンゼリー2 mg 1 包 パクリタキセルの 30 分前

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+)
- HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン _____