

S-1(隔日)療法

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	胆道癌		
開始年月日	年	月	日
体格	身長	cm	体重                    kg                    体表面積                    m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
エスワнтаイホウ	mg / 回	月・水・金・日

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上~1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ ( )    錠 2×朝夕食後
---------------------------

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_