

ニボルマブ+イピリムマブ療法
(オブジーボ+ヤーボイ)

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	悪性胸膜中皮腫 (化学療法未治療患者が望ましい)		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	42 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	最小度	制吐剤	なし
特記事項	ヤーボイは最終濃度 1~4mg/ml にする必要あり。 詳細は注射レジメンに記載あり		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール	
			Day1	Day22
オブジーボ	360mg (mg/body)	30分	●	●
ヤーボイ	mg (1mg/kg)	30分	●	×

【処方が必要な内服薬】

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____

副作用	間質性肺	内分泌腺	大腸炎 重度の下	重症筋無 筋炎	1型糖尿病	皮膚障害	肝障害	心血管障	眼障害	その他
-----	------	------	-------------	------------	-------	------	-----	------	-----	-----