


### トーリセル療法

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	腎細胞癌		
開始年月日	年      月      日		
体格	身長	cm	体重      kg      体表面積      m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	最小度	制吐剤	なし
特記事項	※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、定期的に胸部CT検査を実施する ※ 感染症を起こすことがあるため、投与開始前に肝炎ウイルス、結核など感染の有無を確認する ※ infusion reaction、高血糖、創傷治癒遅延、腎不全、電解質異常などに注意する ※ 生ワクチンは禁忌 ※ 無水エタノールを含有するため、アルコール過敏症のある患者に注意する		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
トーリセル	mg (25mg/body)	30~60分	Day1 (週1回投与)

#### 【減量方法】



#### 【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠 (10) 5錠      トーリセル開始 30分前  
※内服不能の場合はポララミン 10mg+生食 20mL

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)- →  HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_