


ネクサバール療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	腎細胞癌		
開始年月日	年 月 日		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	最小度	制吐剤	なし
特記事項	高脂肪食摂取時は食事 1 時間前から食後 2 時間を避けて服用 ※ 肝機能検査は投与開始 1 ヶ月間は週 1 回、以後 3 ヶ月までは 2 週に 1 回、その後は 1 ヶ月に 1 回の頻度で行う ※ 膵酵素の測定は投与開始 1 ヶ月間は 2 週間隔、その後は 1 ヶ月に 1 度行う		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
ネクサバール	400mg 1日2回	連日服用

【減量方法】



【処方が必要な内服薬】

ピドキサール 10mg 6錠 3×毎食後内服 (1週間前より)
尿素クリーム 1日5回以上塗布 (1週間前より)
ネクサバール (200)

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), or HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), and HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____