

アベルマブ療法
(バベンチオ)

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	膀胱癌 (1次治療の維持療法)					
開始年月日	年	月	日			
1コース期間	14日間					
体格	身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
嘔気・嘔吐リスク	最小度	制吐剤	なし			
特記事項	GC or GCarbo 療法を 4~6 コース施行後に効果 SD 以上の膀胱癌患者が適応					

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
バベンチオ	mg (10mg/kg)		Day1

【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠 (10) 5錠 バベンチオ投与 30分前 (4コース目まで必須)
カロナール錠 (500) 1錠 バベンチオ投与 30分前 (4コース目まで必須)

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), or HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____

免疫チェックポイント阻害薬 副作用対応連携シート

副作用	主な自覚症状	検査項目	ペーシング (投与開始時)	モニタリングの目安	専門医へのコンサルト
			実施		
間質性肺炎	発熱、咳、息苦しい、息切れ	胸部X線	○	投与時	左記の自覚症状発現の場合、左記検査項目の異常が認められた場合には、直ちに相談ください。
		胸部CT	○	疑い時	
		KL6 SP-D	○	2か月毎に2回	
		TSH・FT3・FT4	○	月1回	
内分泌障害	副腎機能不全：身体がだるい、意識がうつれる、考えがまとまらない、嘔吐、むかむかする、食欲不振、低血圧、脱力感 副甲狀腺機能低下症：手足の筋肉の痙攣、手足口の周りの腫れなどのしびれ	抗チロトロピン抗体	○	疑い時	【甲狀腺】 症状出現（倦怠感や動悸など）、TSH・FT3・FT4に異常が認められた際、TSHレセプター抗体、抗チロトロピン抗体、抗TPO抗体を1回測定し、自己抗体陽性で症状発現時はコンサルト 【副腎】 ACTH・コルチゾールを測定した際、コルチゾール低値の場合にコンサルト
		抗TPO抗体	○	疑い時	
		TSHレセプター抗体	○	疑い時	
		iPTH	○	疑い時	
大腸炎 重度的下痢	下痢（軟便）もしくは通常よりも頻回の便通、血便もしくは黒クマール便で粘着質の便、重度的腹部痛もしくは圧痛	排便回数	○	投与時	Grade2以上の下痢、便回数の増加が認められた場合（ペーシングと比べ4～6回/日以上）の排便回数増加 腹痛、下血・便失禁・発熱に特に注意
		腹部CT 大腸内視鏡検査	-	疑い時	
重症筋無力症 筋炎	重症筋無力症：上まぶたが下がる、物がたぶって見える、飲み込みにくい、しゃべりにくい、呼吸困難 筋炎：身体がつかうらない、発熱、飲み込みにくい、息苦しい、発疹、筋肉の痛み	CPK	○	投与時	目が下がってくる（眼瞼下垂） 飲み込みにくい（嚥下障害） 症状発現時あるいは、CPK1000IU/以上の場合にコンサルト
		AChR抗体	-	疑い時	
1型糖尿病	糖尿病：身体がだるい、体重減少、のどの渇き、水を多く飲む、尿の量が増える 糖尿病性ケトアシドーシス：意識の低下、悪心、嘔吐、腹痛	HBA1c	○	月1回	血糖値が、急激に上昇した場合にコンサルト
		ケトアシドーシス 血糖	○	疑い時	
		検尿（尿ケトン体）	○	投与時	
		Cペプチド	-	疑い時	
皮膚障害	湿疹、かゆみ	AST ALT γ-GTP	○	投与時	Grade2以上の皮膚障害
		ALP T-Bil D-Bil LDH	○	投与時	
肝障害	倦怠感、黄疸、嘔吐・嘔気、食欲不振、そう痒感	HBs抗体・HBc抗体 HCV抗体	○	感染歴がある方は3か月毎にDNA量を測定	左記の自覚症状の発現、又はGrade2以上の肝機能障害が認められた場合にコンサルト
		PT APTT フィブリノーゲン 心筋トロポニンT NTproBNP Dダイマー FDP	○	疑い時	
心血管障害	心不全、心筋炎、心房細動、深部静脈血栓	心エコー	○	投与時	左記の自覚症状の発現、又は検査値の異常時にコンサルト
		心エコー 心電図	○	投与時	
眼障害	充血、霧視、羞明、眼痛	Na K Cl Ca P TP ALB UA AMY BUN Cr 血球算定（CBC） Hγカルシウム	○	投与時	左記の自覚症状が発現した場合にコンサルト
		その他	○	投与時	

※検査オーダーは検査セット、統合セットを作成していますので、そちらより使用してください

死亡例が報告されています。早めに専門医へのコンサルトをお願いします