光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

FOLFIRINOX 療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	膵臓癌			
開始年月日	年　月　日		1 コース期間	14　日間
体格	身長　cm　体重　kg　体表面積　㎡			
嘔気・嘔吐リスク	高度	制吐剤	アロカリス注 +パロノセトロン注 +デキサート注 9.9mg +デカドロン錠 4mg2 錠 2×（day2-3）	
特記事項	遺伝子多型（複合ヘテロ及びホモ）では 50%減量を考慮 複合ヘテロ：(*6/*28)　ホモ：(*6/*6)(*28/*28)			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
オキサリプラチン	mg（85mg/㎡）	2 時間	Day1
イリノテカン	mg（180mg/㎡）	2 時間	Day1
レボホリナート	mg（200mg/㎡）	2 時間	Day1
5-FU	mg（400mg/㎡）	15 分	Day1
5-FU	mg（2400mg/㎡）	46 時間	Day1

【処方が必要な内服薬】

デカドロン錠（4）2 錠 2×朝昼食後　2 日分　（翌日開始）
マグミット 330mg　6 錠 3×毎食後　／3 日間
ｳﾙｿﾞﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠 100mg　3 錠 3×毎食後／3 日間
炭酸水素ナトリウム錠 500m g　3 錠 3×毎食後 2 時間　／3 日間

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(−) → □HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−)
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿