

### S-1(4投2休)療法

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

がん種 (適応)	膵臓癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	42 日間		
体格	身長	cm	体重                      kg                      体表面積                      m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
エスワнтаイホウ	mg / 回	4 週服用 2 週休薬

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg / 回
1.25 m <sup>2</sup> 以上~1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg / 回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60 mg / 回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

#### 【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ ( )    錠 2×朝夕食後
---------------------------

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) →  HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_