光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

エルロチニブ+GEM 療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	膵臓癌		
開始年月日	年　　月　　日		
1 コース期間	28　日間		
体格	身長　　cm　　体重　　kg　　体表面積　　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロン注
特記事項 （タルセバ）	※食事の 1 時間前から 2 時間後までは避ける		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール			
			Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
ゲムシタビン	mg（1000mg/㎡）	30 分	●	●	●	×
タルセバ	100mg　1 日 1 回	経口	連日服用			

【処方が必要な内服薬】

タルセバ錠　（100）　1 錠 1×　朝食後 2 時間
ヘパリン類似物質油性クリーム　（全身に使用）
ベタメタゾン酪酸エステル軟膏（アンテベート GE）（体の湿疹に使用）
ロコイド軟膏　（顔の湿疹に使用）
リンデロン VG ローション（頭の湿疹に使用）

□HBs 抗原(＋) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(－) → □HBs 抗体(－)and HBc 抗体(－)
□HBs 抗体(＋)and/or HBc 抗体(＋) → □HBV-DNA 定量(－) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(＋) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿