

### オニバイド+5-FU/I-LV 療法

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

がん種 (適応)	膵臓癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	14 日間		
体格	身長	cm	体重                      kg                      体表面積                      m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項	遺伝子多型 (複合ヘテロ及びホモ) では 50%減量を考慮 複合ヘテロ: (*6/*28)    ホモ: (*6/*6)(*28/*28)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
オニバイド	mg (70mg/m <sup>2</sup> )	90 分	Day1
レボホリナート	mg (200mg/m <sup>2</sup> )	2 時間	Day1
5-FU	mg (2400mg/m <sup>2</sup> )	46 時間	Day1

#### 【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg    6錠 3×毎食後    /3日間
ウルソ® オキシコール酸錠 100mg    3錠 3×毎食後/3日間
炭酸水素ナトリウム錠 500mg (重曹)    3錠 3×毎食後 2時間    /3日間

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), or HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), and HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_