光晴会病院化学療法委員会
2024 年 3 月 1 日改訂

ゲムシタビン+S-1（2 投 1 休）療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	膵臓癌		
開始年月日	年　月　日		
1 コース期間	21　日間		
体格	身長　cm　体重　kg　体表面積　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	グラニセトロン注
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール		
			Day 1	Day 8	Day 15
ゲムシタビン	mg（1000mg/㎡）	30 分	●	●	×
エスワンタイホウ	mg / 回		2 週服用　1 週休薬		

体表面積	初回基準量（テガフール相当量）
1.25 ㎡未満	40mg／回
1.25 ㎡以上～1.5 ㎡未満	50mg／回
1.5 ㎡以上	60 mg／回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

【処方が必要な内服薬】

エスワンタイホウ（）　錠 2×朝夕食後

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(−) → □HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−)　□HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+)　□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿