

**CBDCA+PTX 療法(カルボプラチン+パクリタキセル)**

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重                    kg                    体表面積                    m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (パクリタキセル)	※アルコール含有 パクリタキセルアレルギー予防のデキサメタゾンは、症状がなければ半量 ずつ減量が可能です。(最低量 1.65 mg 1A)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
パクリタキセル	mg (200mg/m <sup>2</sup> )	3 時間	Day1
カルボプラチン	mg (AUC5)	1 時間	Day1

**【処方が必要な内服薬】**

レスタミン錠 (10) 5 錠 1×    パクリタキセル開始 30 分前

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3 カ月毎 定量
- HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) →  HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_