

CBDCA+PTX+BEV 療法(カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ)

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (パクリタキセル)	※アルコール含有 パクリタキセルアレルギー予防のデキサメタゾンは、症状がなければ 半量ずつ減量が可能です。(最低量 1.65 mg 1A)		
特記事項 (ベバシズマブ)	※ベバシズマブの投与時間について 初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、以降 30 分と短縮可		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
パクリタキセル	mg (200mg/m ²)	3 時間	Day1
カルボプラチン	mg (AUC5)	1 時間	Day1
ベバシズマブ	mg (15mg/kg)	※	Day1

【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠 (10) 5 錠 1×パクリタキセル開始 30 分前

HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____