

アレセンサ療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	なし
特記事項	※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、臨床症状の確認及び胸部CT検査等を行う ※ 肝機能障害があらわれることがあるため、定期的に肝機能検査を行う ※ 発疹が出現した場合はリンデロンVG軟膏、ヒルドイドや経口抗ヒスタミン剤にて対処 ※ 光線過敏症の予防が必要（長時間の日光への曝露を避ける、日焼けクリームの使用）		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
ザーコリ	300 mg 1日2回	連日服用

【処方が必要な内服薬】

アレセンサ (300) 2錠 2× 朝夕食後

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____