

### ザーコリ療法

患者番号:                    氏名:                    性別:                    年齢:

がん種 (適応)	ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
体格	身長	cm	体重                    kg                    体表面積                    m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	なし
特記事項	※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、臨床症状の確認及び胸部CT検査等を行う ※ 肝機能障害があらわれることがあるため、定期的に肝機能検査を行う ※ QT 間隔延長、徐脈があらわれることがあるため、定期的に心電図及び電解質検査を行う		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
ザーコリ	250 mg 1日2回	連日服用

#### 【処方が必要な内服薬】

ザーコリ (250) 2錠2×
ドンペリドン錠 10mg 1回1錠 1日3回毎食後 5日分
グラニセトロンゼリー2mg 1包 1日1回嘔気時 5回分

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) → HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_