

ジカディア療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	なし
特記事項	※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、臨床症状の確認及び胸部CT検査等を行う ※ 肝機能障害があらわれることがあるため、定期的に肝機能検査を行う ※ QT延長、徐脈になる事があるため定期的に心電図及び電解質 (Mg K Ca) 検査を行う ※ 高血糖、糖尿病が現れる事があるので定期的に血糖測定を行う ※ 膵炎、リパーゼ増加、アミラーゼ増加が現れる事があるので定期的に検査を行う		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
ジカディア	450 mg	連日服用

【処方が必要な内服薬】

ジカディア (150)	3 カプセル 1×	食後
ヘパリン類似物質油性クリーム		(全身に使用)
ベタメタゾン酪酸エステル軟膏		(体の湿疹に使用)
(※アンテベート GE)		
ロコイド軟膏		(顔の湿疹に使用)
リンデロン VG ローション		(頭の湿疹に使用)

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
 HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
 HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン _____