

ベバシズマブ+タルセバ療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	EGFR 遺伝子変異陽性 (エクソン 19 欠失変異またはエクソン 21 L858R 変異) ・ 切除不能進行 ・ 再発非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	最小度	制吐剤	なし
特記事項	＜ベバシズマブの投与時間＞ 初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目 30 分への短縮可		


投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ベバシズマブ	mg (15mg/kg)	※	Day1
タルセバ	150mg (150mg/day)	経口	連日服用

【処方が必要な内服薬】

タルセバ (150) 1錠 1×

※タルセバの用法は 1日1回 **食事の1時間以上前** または **食後2時間以降**

減量方法 ;



HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)**and/or** HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン