

ペメトレキセド+カルボプラチン療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ペメトレキセド	mg (500mg/m ²)	10 分	Day1
カルボプラチン	mg (AUC5)	90 分	Day1

【処方が必要な内服薬】

パンビタン末 1g1× 初回投与1週間以上前から連日経口開始
デカドロン(4) 2T2× (ペメトレキセドの前後1日)

<注射>

メコバラミン注 500 2A

(初回投与1週間前から9週ごとに筋肉内投与だがペメトレキセドと同日に投与可)

HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____