

ペメトレキセド+シスプラチン療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種 (適応)	非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重 kg 体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	高度	制吐剤	アロカリス注+パロノセトロン注 +デキサート注 9.9mg +デカドロン錠 (4) 2 錠 2×(day2-3)
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ペメトレキセド	mg (500mg/m ²)	10分	Day1
シスプラチン	mg (60~75mg/m ²)	2時間	Day1

【処方が必要な内服薬】

パンビタン末 1g1× 初回投与 1 週間以上前から連日経口開始
デカドロン(4) 2T2×朝昼 (ペメトレキセドの前 1 日+シスプラチン投与翌日から 2 日間)
<注射>
メコバラミン注 500 2A
(初回投与 1 週間前から 9 週ごとに筋肉内投与だがペメトレキセドと同日に投与可)

- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
 HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
 HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____