

**ペメトレキセド+シスプラチン+Bev 療法**

患者番号:                      氏名:                      性別:                      年齢:

がん種 (適応)	非小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	21 日間		
体格	身長	cm	体重                      kg                      体表面積                      m <sup>2</sup>
嘔気・嘔吐リスク	高度	制吐剤	アロカリス注 +パロノセトロン注 +デキサート注 9.9mg +デカドロン錠 4mg2錠 2×(day2-3)
特記事項	ベバシズマブは扁平上皮癌では使用しない <b>※ベバシズマブの投与時間について</b> <b>初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、以降 30 分と短縮可</b>		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ペメトレキセド	mg (500mg/m <sup>2</sup> )	10 分	Day1
シスプラチン	mg (75mg/m <sup>2</sup> )	2 時間	Day1
ベバシズマブ	mg (15mg/kg)	※	Day1

**【処方が必要な内服薬】**

パンビタン末 1g1×    初回投与 1 週間以上前から連日経口開始  
デカドロン(4) 2T2×朝昼 ((ペメトレキセドの前 1 日+翌日~)  
<注射>  
メコバラミン注 500    2A  
(初回投与 1 週間前から 9 週ごとに筋肉内投与だがペメトレキセドと同日に投与可)

- HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**
- HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

**指示医師サイン** \_\_\_\_\_